

INSTRUCCIONES PARA PREPARARSE PARA EGD/ERC/PEG

www.granitepeaksgi.com

Teléfono 801.619.9000

Sitio donde se llevará a cabo el procedimiento

- Granite Peaks Endoscopy Center: 10150 South Petunia Way, Sandy, Utah 84092
(por el lado oeste del edificio, entrando por el nivel inferior)

Hora de llegada _____ **Hora del procedimiento** _____

▪ **El día antes de su examen**

Lea todas las instrucciones a cabalidad. No coma nada después de la medianoche.

Si usted tiene alergias severas a los frijoles de soya y/o a los huevos, por favor contáctenos de inmediato.

▪ **El día de su examen**

Beba únicamente líquidos claros (agua, café negro, te, soda, caldos) hasta **tres horas antes** de su hora de llegada.

Traiga con usted

- Una lista con todos los medicamentos recetados o de venta libre que esté tomando, incluyendo el tipo de dosis/potencia y la hora en que tomó la última dosis.
- Un formato de Historia del Paciente debidamente llenado, documento de identificación con fotografía, tarjeta de seguro e información de su compañía de seguro médico
- Si usted está sedado, necesita traer un conductor responsable para que lo lleve a casa.

Medicinas recetadas

- Tome únicamente las medicinas para su corazón, presión sanguínea, asma y convulsiones de acuerdo a la receta. Si usted toma estas medicinas regularmente por la mañana, tómelas como siempre con un pequeño sorbo de agua al menos **tres horas** antes de su hora de llegada. **¡Traiga consigo su inhalador!**
- Si para el dolor usted toma regularmente algún medicamento narcótico, procure mantener su horario pero tome la medicina por lo menos **tres horas** antes de llegar.

Diabéticos

- Hágase de prueba de azúcar sanguínea antes de venir a su procedimiento y traiga el resultado con usted. *Si toma medicinas por vía oral para su diabetes: no la tome en la mañana de su procedimiento. Si usa insulina: no la tome pero traiga su insulina.*
- Si tiene cualquier pregunta con respecto a sus medicinas orales o dosis de insulina, sírvase contactar al médico que controla su diabetes.

Pacientes que toman diluyentes para la sangre

- Si usted toma diluyentes para la sangre tal como Coumadin, Warfarin o Plavix, **llame al médico que le recetó el medicamento y pregúntele si usted puede dejar de tomarlo durante el período de tres días antes de su procedimiento.**
- Si se requiere hacer una biopsia durante su procedimiento y usted no ha dejado de tomar el diluyente de sangre por tres días, puede que sea necesario reprogramar su procedimiento para una fecha posterior debido al incrementado riesgo de sangrado.

Madres que están dando pecho

- Después de ser sedada, tiene que bombear y botar toda su leche dos veces antes de dar pecho a su bebé.

Si tiene cualquier pregunta después de leer estas instrucciones, sírvase visitar nuestro sitio web www.granitepeaksgi.com, o llame a su médico